



Ureaplasma urealyticum je malena bakterija iz grupe mikroplazmi, a izolirane su tri vrste uzročnika: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium.

Uzrok

Mycoplasma genitalium i Ureaplasma urealyticum uzrokuje nespecifične urogenitalne infekcije kod oba spola. Istraživanja pokazuju da se već novorođenčad oba spola može njima zaraziti tijekom prolaza kroz zaraženi porođajni kanal roditelje, ta je zaraza prolazna, a naseljavanje genitalnog sustava mikoplazmama u ljudi počinje nakon puberteta i ovisno je uglavnom o seksualnoj aktivnosti. Možete ih dobiti spolnim kontaktom i nespolnim putem intimnijim socijalnim kontaktom (na mjestima gdje dolazite u dodir sa tuđim rubljem, ručnicima, kod masera, kozmetičara, u solarijima).

Znakovi

Simptomi su iscijedak svrbež, peckanje, osjetljivost, bol i nelagoda. Česte su tzv. nespecifične upale mokraćne cijevi kod muškaraca, upale vrata maternice i upalne bolesti male zdjelice kod žena. Sve češće se povezuje s nastankom neplodnosti, prijevremenih porođaja i pobačaja.

Liječenje

Liječi se pomoći lijekova. Lijekovi kojima se liječe su doksicilin, azitromicin, linkomicin, klindamicin, ciprofloksacin ili ertritomicin, ovisi o uzročniku. Liječiti treba sve partnere, a nakon provedene terapije treba ponoviti nalaze obrisaka i urina te drugih sekreta i nakon 2-4 mjeseca zbog čestih recidiva infekcije. Dok se terapija ne završi potrebno je suzdržavati se od spolnih

Ureaplasma urealyticum

Autor Lea Lukić
Četvrtak, 16 Prosinac 2010 15:48

odnosa.

Izvori:

www.vasezdravlje.com

www.zdravstveni-vodic.cromaps.com

www.ordinacija.hr

Pripremila: Lea Lukić, Medikus kreativni laboratorij

